Les productions fruitières

par D. Basbois

3 mars 2018

Coursonne

C'est un ensemble de productions qui partent de la branche charpentière c'est sur les coursonnes qu'on applique la taille ou l'éclaircissage.

Rameau à bois

Il est issu d'un œil à bois. Il s'est développé l'année précédente. Plus il est vertical plus il est vigoureux et moins il aura tendance à fructifier. Sur pommier poirier en principe il ne porte que des yeux à bois il sera coupé à deux ou trois yeux sauf les prolongements. Sur les arbres à noyaux il porte des yeux à bois mais il peut également avoir des fleurs. S'il ne porte que des yeux à bois on peut le couper au-dessus du quatrième ou cinquième œil.

Œil à bois

Se rencontre sur un rameau de l'année s'il reçoit beaucoup de sève il donnera un rameau à bois ou un gourmand s'il reçoit moins de sève il se transformera. Sur les arbres à noyaux on coupe le plus souvent au-dessus d'un œil à bois

Dard

Porté par un court rameau à bois c'est un petit bourgeon pointu. Il se rencontre sur arbre à pépins il est issu d'un œil à bois, il doit se transformer vers des fleurs ou rester latent une ou plusieurs années. S'il reçoit beaucoup de sève il peut devenir brindille ou rameau On l'appelle encore bourgeon mixte.

Brindille

Petit rameau de faible vigueur longueur inférieure à 20 cm on ne la taille pas on évite de l'alimenter en sève pour qu'elle évolue (garder un œil ou une autre production au-dessus).

Brindille couronnée

L'année suivante à l'extrémité de la brindille apparaît un bouton à fleur c'est une production intéressante sur les arbres à pépins, les yeux situés en dessous évolueront vers des boutons à fleur.

Chiffonne

Se rencontre sur pêcher abricotier, ressemble à la brindille le plus souvent porte des boutons à fleur on ne taille pas. L'année suivante si elle porte un œil à bois à sa base on taille audessus. Pour les autres arbres à noyaux on parle de brindille fruitière.

Rameau mixte

Ne se rencontre que sur les arbres à noyaux. C'est un rameau qui présente des yeux à bois et des boutons à fleur. On taille au-dessus de quatre ou cinq boutons à condition que ces boutons soient accompagnés d'un œil à bois sinon on coupe au-dessus d'un œil à bois

Bouton à fleur

Plus gros qu'un œil à bois et renflé, il se rencontre sur jeunes rameaux pommier et poirier pour les variétés fructifères (Golden, William), il est issu de la transformation d'un œil à bois. Il se situe à l'extrémité de la brindille pour la brindille couronnée

Le bouton à fleur est fréquent pour les arbres à noyaux il se rencontre sur les rameaux et les brindilles.

Lambourde et bouquet de mai

Portée par un court rameau c'est un bourgeon rond et plus important que le dard. La lambourde est l'évolution d'un dard sur pommier et poirier. Elle ne peut donner que des fleurs et des fruits. Il faut donner le maximum de sève aux lambourdes en taillant juste audessus, en conserver au maximum trois par coursonne.


Porté par un court rameau, le bouquet de mai peut être considéré comme l'équivalent de la lambourde mais il résulte de la transformation d'un œil à bois. Le bouquet de mai se rencontre sur les arbres à noyaux, très intéressant il donnera des fleurs et des fruits.

Bourse

Se rencontre que sur pommier poirier. A la récolte des fruits un afflux de sève se produit ou était inséré le pédoncule provoquant un renflement. Sur ces bourses apparaissent dards et boutons à fleur

Gourmand

Rameau puissant qui a reçu beaucoup de sève, il n'est pas intéressant. Souvent vertical il absorbera trop de sève au détriment des autres productions. Généralement on le coupe à ras.



Axe principal sur lequel se developperont les charpentieres Prolongement des charpentières Marpentières sur les quelles dowent se Coupes à developpen de Coursonnes